

| <p>Commune / Lieu: Le Mouret</p> | <p>Plac.tém.: No. 1</p> | <p>Date: 10.06.2011</p> | <p>Auteur: Y. Wiedmer/ M. Berger</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------|-----|----------------------|-----|
| <p>Histoire du peuplement: Le peuplement est issu d'une plantation sur un pâturage à la fin du XIXe siècle. Un éclaircie sélective a eu lieu il y a environ 30 ans. Quelques chablis Lothar. Intervention visant à stabiliser le peuplement en février 2011. La ligne de câble passait sur la limite ouest de la placette.</p> | <p>Surface du sol: Sol recouvert de végétation. Beaucoup de rajeunissement présent</p> | <p>Végétation:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèces essentielles (aspect visuel)</th> <th>Recouvrem. en 1/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hylocomium splendens</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>Luzula sylvatica</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>Festuca altissima</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Polygonatum verticillatum</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Galium odoratum</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>Dryopteris filix-mas</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autres espèces: Athyrium filix femina Vaccinium myrtillus</p> | | Espèces essentielles (aspect visuel) | Recouvrem. en 1/10 | Hylocomium splendens | 0.4 | Luzula sylvatica | 0.2 | Festuca altissima | 0.1 | Polygonatum verticillatum | 0.1 | Galium odoratum | 0.1 | Dryopteris filix-mas | 0.1 |
| Espèces essentielles (aspect visuel) | Recouvrem. en 1/10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hylocomium splendens | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luzula sylvatica | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Festuca altissima | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polygonatum verticillatum | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galium odoratum | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dryopteris filix-mas | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Atteintes / pollution: Epicéa: pourriture rouge très présente</p> | <p>Partie supérieure du sol:</p> | <p>Rajeunissement: Rajeunissement de sa, hê et ér's bien présent sur la placette.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dégâts: Peu de dégâts d'abrutissement</p> | <p>Partie inférieure du sol: alternance de creux et de bosses avec une saturation en eau variant en fonction de cette topographie. Creux saturés en eau, bosses peu/pas saturées</p> | <p>Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie: Volume sur pied en 2011: 490 sv/ha Volume sur pied en 2003 (avant la dernière intervention): 685 sv/ha (Inventaire en annexe)</p> <p>Stade de développement / type de structure: Moyenne futaie</p> | | | | | | | | | | | | | | | |