

NaiS / Formulario 3

Descrizione dettagliata dello stato

Comune / luogo: Avegno-Gordevio - Cappella del Crocifisso		Sup.tipo.n.: 1	Data: 05.07.2023	Responsabile: For. Alessandro Zanoli																							
Storia del popolamento: La presenza di alcuni grossi castagni indicano che probabilmente ai tempi la zona era gestita come selva castanile. Tuttavia più della metà degli alberi proviene da una vecchia ceduzione (ca. 30-40 anni). La ceduzione potrebbe essere collegata all'incendio del maggio del 1990 che ha colpito la zona interessata (superficie incendio 110 ha). Altri 3 incendi avvenuti a monte della superficie tipo (1972-1976-2004) confermano che l'area è soggetta agli incendi boschivi.		Superficie del terreno: All'interno della superficie ci sono numerosi alberi sradicati. Buona scabrosità del terreno. Presenza di materiale detritico in superficie.		Strato erbaceo e arbustivo: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Copertura in 1/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Felce aquilina</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Festuca</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Rovi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nocciolo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Agrifoglio</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>Ailanto - Buddleja - Robinia</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Altri specie:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table>			Copertura in 1/10	Felce aquilina	2	Festuca	3	Rovi	1	Nocciolo	1	Agrifoglio	0.5	Ailanto - Buddleja - Robinia	0.5	Altri specie:							
	Copertura in 1/10																										
Felce aquilina	2																										
Festuca	3																										
Rovi	1																										
Nocciolo	1																										
Agrifoglio	0.5																										
Ailanto - Buddleja - Robinia	0.5																										
Altri specie:																											
Sollecitazioni: <u>Principali:</u> Siccità Phytophthora (da verificare la presenza) Deperimento del frassino Neofite Selvaggina <u>Secondarie:</u> Cancro corticale del castagno Cinipide		Strato superiore del suolo: 		Rinnovazione: Presenza puntuale di rinnovazione naturale con mescolanza mista (Fr, Ci, Rov, Fa, Ti, Ca, Frangola, nocciolo). La maggior parte della rinnovazione soffre la concorrenza vegetativa.																							
Danni: Numerosi castagni in deperimento, da verificare la causa (Phytophthora, siccità??) Frassini in deperimento Su alcuni tronchi si nota la presenza di vecchi danni dovuti all'incendio. Sono presenti anche singoli danni da caduta sassi Presenza di danni da brucatura della selvaggina. Nella zona è presente pure il cinghiale ma quest'ultimo rappresenta quasi un vantaggio (aerazione del suolo).		Sottosuolo: Terra bruna acida, terreno superficiale ricco di schelettro e con accumulo della lettiera.		Provvigione, accrescimento, produzione di legname: Con il cavallettamento totale è stata stimata una provvigione di ca. 346 mc/ha (usato tariffa Canton Ticino 1.3). Annesso: verbale del cavallettamento <input checked="" type="checkbox"/> Annesso: verbale della martellata <input type="checkbox"/> Stade de développement / type de structure: Fustaia adulta, a zone ceduo invecchiato.																							