


NaiS / Formulario 1

Descrizione

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------------|------|
| Comune / luogo: | Bidogno - Fiume Bello | Sup.tipo.n.: | 2 | Area (ha): | 0.86 | Data: | 20.01.2023 | Responsabile: | M.A. |
| Coordinate: | 2°72'889 / 1°105'537 | | Quota s.l.m.: | 1'060 | | Inclinazione: | 35° | | |
| Allegati: | <input checked="" type="checkbox"/> Form 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Form 3 | <input type="checkbox"/> Form 4 | <input type="checkbox"/> Form 5 | <input checked="" type="checkbox"/> Piano 1:5'000 | <input checked="" type="checkbox"/> Documentazione fotografica | <input checked="" type="checkbox"/> Altro: | Lista cavallettamento | |

Schizzo planimetrico



Funzione(i) del bosco:

Bosco di protezione - Frane, erosione, colate detritiche

Comparto con uguale obiettivo:

Vecchia piantagione di Larice (1920), Faggeta montana con erba lucciola maggiore

Motivazione della superficie tipo::

Rappresenta l'effetto secolare di una piantagione di larice in transizione verso un bosco naturale idoneo alla stazione. Che efficacia hanno i larici sulla tenuta del terreno? Quali saranno le misure efficaci per permettere un rinnovamento naturale?

Aspetto del popolamento:

(schizzo del profilo, breve descrizione)

Popolamento misto conifere/latifoglie su terreno molto ripido e franoso, spesso le piante vetuste si rovesciano a causa del terreno molto superficiale. La presenza di abete bianco non garantisce il ringiovanimento della specie, a differenza il faggio e l'abete rosso subiscono meno pressione dalla selvaggina.

