

| Gemeinde: Mels | Ort: Legiwald | Weiserfl. Nr. 3-11 | Datum: 30.11.2009 | BearbeiterIn: Willi Marthy | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|------|------------------------------------|------|-----------|------|
| Bestandesgeschichte: Wahrscheinlich Pflanzung vor ca. 120 Jahren, nach Holzausbeutung für Eisenerzverhüttung. | Bodenoberfläche: gleichmässig geneigt mit quer verlaufendem Felsband | Krautschicht: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aspektbestimmende Arten:</th> <th>Deckung in $\frac{1}{10}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in Lücken Himbeere, Brombeere, Lattich auf vernässten Stellen:</td> <td>4/10</td> </tr> <tr> <td>Pestwurz im geschlossenen Wald:</td> <td>6/10</td> </tr> <tr> <td>Sauerklee</td> <td>2/10</td> </tr> </tbody> </table> Weitere Arten: | | | Aspektbestimmende Arten: | Deckung in $\frac{1}{10}$ | in Lücken Himbeere, Brombeere, Lattich auf vernässten Stellen: | 4/10 | Pestwurz im geschlossenen Wald: | 6/10 | Sauerklee | 2/10 |
| Aspektbestimmende Arten: | Deckung in $\frac{1}{10}$ | | | | | | | | | | | |
| in Lücken Himbeere, Brombeere, Lattich auf vernässten Stellen: | 4/10 | | | | | | | | | | | |
| Pestwurz im geschlossenen Wald: | 6/10 | | | | | | | | | | | |
| Sauerklee | 2/10 | | | | | | | | | | | |
| Belastung: - Schnee | Oberboden: | Verjüngung: - Fichte (sehr wenig Bu, B'Ah, Ta) | | | | | | | | | | |
| Schäden: - Wildverbiss: 40% der Jungpflanzen bis 1.0 m - Windwurf: ca. 10 Bäume auf Weiserfläche | Unterboden: Bodenoberfläche Nadelstreu wenig durchlässig mittelgründig skeletthaltig f(Verrucano) | Vorrat, Zuwachs, Holzanfall: Vorrat auf Weiserfläche: 325fm/ha (170 fm / 0.52ha) Zuwachs: ca. 7 fm (Schätzung) | | | | | | | | | | |
| | Profilskizze | Kluppierungsprotokoll beigelegt <input checked="" type="checkbox"/> ja Anzeichnungsprotokoll beigelegt <input type="checkbox"/> ja Entwicklungsstufe/Strukturtyp: mittleres Baumholz | | | | | | | | | | |