

Commune / Lieu: **Bagnes / Servay** Date: **31.07.1997** Auteur: **Nivalp et Silvaplus**

1. Type(s) de station: **Pessière à Homogyne typique / avec Calamagrostide velue**
2. Danger naturel + efficacité: **Avalanches - zone de déclenchement --> Effet potentiel de la forêt : GRAND dans les forêts de mélèze dès 30° (58%) de déclivité et dans les forêts de résineux à aiguilles persistantes dès 35° (70%) de déclivité.**

3. Etat, tendance évolutive et mesures					6. Objectifs intermédiaires avec indicateurs			
Caractéristiques du peuplement et des arbres	Profil minimal (dont dangers naturels)	Profil idéal (dont dangers naturels)	etat actuel	Etat actuel, Evolution sur 10 et 50 ans	Remarque	Mesures efficaces	Prochain contrôle en 2024	
<ul style="list-style-type: none"> Mélange (genre et degré) 	- mél 0 - 30 % - sorb'oi Semenciers - 30 % - ép 70 - 100 %	- mél 0 - 10 % - sorb'oi 5 % - ép 85 - 95 %	- ar 10%, mél 70-80%, ép 10%				<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Structure verticale (répartition Ø) 	- Suffisamment d'arbres susceptibles de se développer au moins dans 2 classes de diamètre différentes par ha	- Suffisamment d'arbres susceptibles de se développer au moins dans 3 classes de diamètre différentes par ha	- 2 strates - grande répartition des diamètres				<input type="checkbox"/>	- Structure : 2 strates / Etagée (2024) - Répartition des DHP : Grande répartition des diamètres (99999)
<ul style="list-style-type: none"> Structure horizontale (Degré de recouvrem., longueur des trouées, nombre de tiges) 	- Par collectifs, évent. par pieds isolés - 30° et + --> trouée < 60 m - 35° et + --> trouée < 50 m - 40° et + --> trouée < 40 m - 45° et + --> trouée < 30 m - Si la longueur de la trouée dépasse les indications ci-dessus, sa largeur doit être < 15m. - Degré de couverture > 50% - Exigences minimales atteintes (en fonction du type de station)	- Degré de fermeture: entrouvert à espacé - Par collectifs, évent. par pieds isolés - 30° et + --> trouée < 50 m - 35° et + --> trouée < 40 m - 40° et + --> trouée < 30 m - 45° et + --> trouée < 25 m - Si la longueur de la trouée dépasse les indications ci-dessus, sa largeur doit être < 15m. - Degré de couverture > 50% - Exigences idéales atteintes (en fonction du type de station)	- par collectifs - trouées 40x20 m - 300 tiges/ha				<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> Éléments stabilis. (développem. couronne, coeff. d'élanement, diamètre final visé) 	- Troncs d'aplomb, bien enracinés; au max. quelques arbres fortement penchés - Longueur min. des couronnes 2/3	- Troncs d'aplomb, bien enracinés; pas d'arbre fortement penchés - Couronnes jusqu'au sol	- coeff. d'élanement : ar <70, mél < 70, ép < 80 - enracinement moyen - longueur des couronnes : ar 1/1, mél 1/5, ép 1/1				<input type="checkbox"/>	- ° : - longueur des couronnes : ar 1/1, mél > 3/4, ép >3/4 - coeff. d'élanement : ar <70, mél < 70, ép < 80 - enracinement bon (99999)
<ul style="list-style-type: none"> Rajeunissement - lit de germination 	- 57C: Protection contre le glissement du manteau neigeux (souches, bois mort, pierres, etc.) - Bois en décomposition ou microstations surélevées avec petits groupes de sorbiers des oiseleurs ou avec matière minérale: tous les 10 m (100 emplacements/ha)	- 57C: Protection contre le glissement du manteau neigeux (souches, bois mort, pierres, etc.) - Bois en décomposition ou microstations surélevées avec petits groupes de sorbiers des oiseleurs ou avec matière minérale: tous les 8 m (150 emplacements/ha)				- Création d'un peuplement / Scarification du sol : scarification et entreposage de bois pourri	<input checked="" type="checkbox"/>	- Bois mort sur le sol : bois mort sur le sol tous les 10 m (99999) - ° : - sol minéral brut sur 5 % de la surface (99999)
<ul style="list-style-type: none"> Rajeunissement - recrû initial (10 cm à 40 cm) 	- Épicéa et sorbier des oiseleurs présents au moins dans 1/3 des endroits propices au rajeunissement	- Épicéa et sorbier des oiseleurs présents au moins dans 1/2 des endroits propices au rajeunissement	- fort abroustissement du mél : 90-100% du recrû - recrû : ar -, mél +, ép (+)			- Protection des forêts / -1 : régulation du gibier	<input type="checkbox"/>	- -1 : présent sur 10% de la surface (99999)
<ul style="list-style-type: none"> Rajeunissement - rajeun. Établi (jusqu'au fourré: plus de 40 cm haut et jusqu'à 12 cm DHP) 	- Mélange conforme au but - Au moins 70 cellules de régénération/ha (en moyenne tous les 12 m)	- Mélange conforme au but - Au moins 100 cellules de régénération/ha (en moyenne tous les 10 m)	- rajeunissement de ar seulement en dessus de 2040 m - rajeunissement : ar -, mél +, ép (+)				<input type="checkbox"/>	

très mauvais minimal idéal

4. Intervention nécessaire oui non

Prochaine intervention:

5. Urgence faible moyenne élevée

