



NaiS / Formular 3

| Gemeinde / Ort: Bosco Cioss, Quinto | Weiserfl.: Nr. 41.1 | Datum: 18.10.2022 | BearbeiterIn: V.Jelmini & C.Beffa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| Bestandesgeschichte: In origine la superficie era adibita a pascolo. | Bodenoberfläche: Assenza totale di luce e di conseguenza ringiovinimento | | Krautschicht: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Aspektbestimmende Arten:</th> <th>Deckung in 1/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Vaccinum myrtillus</i>,</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Calamagrostis villosa</i>,</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>,</td> <td>in totale ca. 1/10</td> </tr> <tr> <td><i>Luzula nivea</i>,</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Genere <i>Dryopteris</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Weitere Arten:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table> | Aspektbestimmende Arten: | Deckung in 1/10 | <i>Vaccinum myrtillus</i> , | | <i>Calamagrostis villosa</i> , | | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> , | in totale ca. 1/10 | <i>Luzula nivea</i> , | | Genere <i>Dryopteris</i> | | Weitere Arten: | | | | | |
| Aspektbestimmende Arten: | Deckung in 1/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Vaccinum myrtillus</i> , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Calamagrostis villosa</i> , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> , | in totale ca. 1/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Luzula nivea</i> , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genere <i>Dryopteris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weitere Arten: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belastung: Precipitazioni in forma di neve bagnata e pesante | Oberboden:  | | Verjüngung: Sporadici semenziali di abete rosso, acero e sorbo degli uccellatori | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schäden: Nessun danno particolare. | Unterboden:  | | Vorrat, Zuwachs, Holzanfall: Volume legno unità volume: 13.5 m ³ Volume legno superficie ST: 169 m ³ Provvigione: 337 m ³ Kluppiierungsprotokoll beigelegt <input checked="" type="checkbox"/> ja Anzeichnungsprotokoll beigelegt <input type="checkbox"/> ja Entwicklungsstufe/Strukturtyp: Fustaia giovane a matura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |