

NaiS / Formular 3

Erweiterte Zustandsbeschreibung

Gemeinde / Ort: Adelboden / Bannwald	Weiserfl.: Nr. 9	Datum: 23.09.2009	BearbeiterIn: T. Mühlemann / Ch. von Grünigen												
<p>Bestandesgeschichte: Im Wirtschaftsplan von 1978 wird der Bestand als stufiger Bestand beschrieben. nach der Nutzungskontrolle der Jahre 1978 bis 1995 waren die Nutzungen im Bannwald im Schnitt etwa 100 m³ / Jahr (aus heutiger Sicht sehr wenig). Das Jahr der Seilkrannutzung kann nicht angegeben werden. Die Pflanztätigkeit im Bannwald war ab 1980 beträchtlich: bis 1988 jährlich ca. 1'000 Fichten.</p>	<p>Bodenoberfläche:</p>	<p>Krautschicht:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aspektbestimmende Arten:</th> <th>Deckung in 1/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buntes Reitgras</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Weitere Arten:</p>		Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10	Buntes Reitgras									
Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10														
Buntes Reitgras															
<p>Belastung:</p>	<p>Oberboden:</p> <p>Zersetzungsphasen der Vegetationsrückstände</p> <p>cm</p> <p>12 8 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18</p> <p>organische Auflage</p> <p>Bodenoberfläche</p> <p>Vermischungstiefe der Mineralerde mit organischem Material</p> <p>Rohhumus Moder Mull</p> <p>mehrfährige einjährige</p> <p>Streu</p> <p>zunehmende biologische Bodenaktivität</p>	<p>Verjüngung:</p>													
<p>Schäden Steinschlagschäden</p>	<p>Unterboden:</p> <p>cm Profilskizze</p> <p>0 2 4 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120</p>	<p>Vorrat, Zuwachs, Holzanfall: Vorrat Weiserfläche = 584 Tfm/ha oder 430 Tfm /ha.</p> <p>Kluppierungsprotokoll beigelegt <input checked="" type="checkbox"/> ja Anzeichnungsprotokoll beigelegt <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Entwicklungsstufe/Strukturtyp:</p>													

